



Akébie à cinq feuilles

Akebia quinataFamille des *Lardizabalaceae*

Originaire d'Asie de l'est


ELEMENTS MORPHOLOGIQUES ET DESCRIPTIFS

Liane grimpant jusqu'à 10m, à feuillage persistant sous climat chaud. Feuilles alternes composé-palmées à 5 folioles de 3,5 à 7,5cm. Fleurs unisexuées apétales à 3 sépales pétaloïdes et à odeur de vanille, disposées en racèmes axillaires pendants apparaissant au printemps. Fleurs mâles violet pâle, par 4 à 15, aux sépales réfléchis de 5-10mm, à 6-7 étamines ; les femelles violet-brunâtre souvent par 2, plus longuement pédicellées, à 3-4 sépales de 10-30mm et 5-7 carpelles. Fruits à aspect de saucisses gris-violacées de 6,5-10cm contenant de nombreuses graines noires à rougeâtre dans une pulpe blanche.

Feuille



Inflorescence



Fruits



Liane

**SITUATION ECOLOGIQUE**

Cultivée pour l'ornement, cette liane se développe sur sol riche et bien drainé et est adaptée à un fort ensoleillement. Au niveau de la station où elle est connue naturalisée en Aquitaine, elle forme des fourrés denses en bord de chemin où seules quelques espèces exotiques comme la renouée du Japon ou la vigne vierge arrivent à se développer, et recouvre les arbres à proximité.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Akebia quinata est très peu connue en France. Seule une station a été recensée en 2004 en Aquitaine (J. VIVANT, 2005), à proximité du Gave de Pau, où l'espèce a été revue en 2012.

**MOYENS DE LUTTE & DE CONTROLE**

Aucun moyen de gestion n'est encore recensé pour cette espèce. Son système racinaire supporterait cependant mal les perturbations.

VOS OBSERVATIONS NOUS INTERESSENT

Le Conservatoire botanique suit la colonisation de cette espèce et tente d'enrayer son invasion. Il est important de nous signaler toute observation nouvelle à :